

| Sigla | Procedimento                               | PREPARO  | ORIENTAÇÕES   |
|-------|--|--|---|
| RX    | COLANGIOGRAFIA POS-OPERATORIA (PELO DRENO) | Não há preparo   |   |
| RX    | ENEMA OPACO OU CLISTER (DUPLO CONTRASTE)   | Não há preparo   |   |
| RX    | ESOFAGO                                    | Não há preparo   |   |
| RX    | HISTEROSSALPINGOGRAFIA                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jejum de 6 horas. Pode beber água.</li> <li>• Abstinência sexual de 02 (dois) dias.</li> <li>• Tomar 01 (um) comprimido de buscopam Simples ou 01 (um) comprimido de Toragesic sublingual.</li> <li>• A paciente deve estar entre o 6º até o 12º dia do ciclo menstrual, ou seja, após a menstruação.</li> <li>• Trazer 1 (um) absorvente higiênico.</li> <li>• O exame é contra-indicado se há suspeita de gravidez, para tanto a paciente deve possuir Beta HCG recente (máximo 03 dias) antes da data do exame.</li> <li>• O exame é contra indicado se a paciente possuir DIU / febre e/ou se existir suspeita de infecção ativa.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comparecer com 30 minutos de antecedência.</li> <li>• Vir acompanhada de alguém maior de 18 anos.</li> <li>• Trazer pedido médico e exames anteriores.</li> <li>• A paciente não pode estar no período menstrual.</li> </ul> |
| RX    | REED-ESOFAGO-HIATO-ESTOMAGO E DUODENO      | Não há preparo   |   |
| RX    | RX ABDOME AGUDO                            | <p><b>Exames agendados pela manhã:</b></p> <p><b>Na véspera do exame:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tomar Luftal:</b> 1 cápsula ou 60 gotas de 8/8 horas.</li> <li>• <b>Almoço:</b> alimentar-se de canjas, caldo de carnes, sucos de frutas coados, gelatinas, chá e torradas sem manteiga. Evitar leite e derivados e bebidas gasosas.</li> <li>• <b>Às 18:00h tomar:</b> 02 comprimidos de Lactopurga ou 02 comprimidos de Dulcolax</li> <li>• <b>Jantar:</b> até as 20 horas (mesma orientação do almoço).</li> <li>• Após as 23 horas jejum <b>ABSOLUTO</b> até o horário do exame.</li> </ul> <p><b>Exames agendados à tarde:</b></p> <p><b>Na véspera do exame:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jantar:</b> alimentar-se de canjas, caldo de carnes, sucos de frutas coados, gelatinas, chá e torradas sem manteiga. Evitar leite e derivados e bebidas gasosas.</li> <li>• <b>Às 18:00h tomar:</b> 02 comprimidos de Lactopurga ou Dulcolax e 1 cápsula ou 60 gotas de Luftal.</li> </ul> <p>No dia do exame:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Café da manhã:</b> tomar chá com torradas e evitar leite e derivados do leite. Tomar 1 cápsula ou 60 gotas de Luftal.</li> <li>• Jejum <b>ABSOLUTO</b> de, no mínimo, 6 horas antes do exame.</li> </ul> |   |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| RX | RX ABDOME SIMPLES                                    | <p><b>Exames agendados pela manhã:</b></p> <p><b>Na véspera do exame:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tomar Luftal:</b> 1 cápsula ou 60 gotas de 8/8 horas.</li> <li>• <b>Almoço:</b> alimentar-se de canjas, caldo de carnes, sucos de frutas coados, gelatinas, chá e torradas sem manteiga. Evitar leite e derivados e bebidas gasosas.</li> <li>• <b>Às 18:00h tomar:</b> 02 comprimidos de Lactopurga ou 02 comprimidos de Dulcolax</li> <li>• <b>Jantar:</b> até as 20 horas (mesma orientação do almoço).</li> </ul> <p>- Após as 23 horas jejum <b>ABSOLUTO</b> até o horário do exame.</p> <p><b>Exames agendados à tarde:</b></p> <p><b>Na véspera do exame:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Jantar:</b> alimentar-se de canjas, caldo de carnes, sucos de frutas coados, gelatinas, chá e torradas sem manteiga. Evitar leite e derivados e bebidas gasosas.</li> <li>• <b>Às 18:00h tomar:</b> 02 comprimidos de Lactopurga ou Dulcolax e 1 cápsula ou 60 gotas de Luftal.</li> </ul> <p><b>No dia do exame</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Café da manhã:</b> tomar chá com torradas e evitar leite e derivados do leite. Tomar 1 cápsula ou 60 gotas de Luftal.</li> <li>• Jejum <b>ABSOLUTO</b> de, no mínimo, 6 horas antes do exame.</li> </ul> |  |
| RX | RX ADENOIDES OU CAVUM                                | Não há preparo   |  |
| RX | RX ANTEBRACO   | Não há preparo   |  |
| RX | RX ARCOS ZIGOMATICOS OU MALAR OU APOFISES ESTILOIDES | Não há preparo   |  |
| RX | RX ARTICULACAO ACROMIOCLAVICULAR                     | Não há preparo   |  |
| RX | RX ARTICULACAO COXOFEMORAL (QUADRIL)                 | Não há preparo   |  |
| RX | RX ARTICULACAO ESCAPULOUMERAL (OMBRO)                | Não há preparo   |  |
| RX | RX ARTICULACAO ESTERNOCLAVICULAR                     | Não há preparo   |  |
| RX | RX ARTICULACAO TEMPOROMANDIBULAR - BILATERAL         | Não há preparo   |  |
| RX | RX ARTICULACAO TIBIOTARSICA (TORNOZELO)              | Não há preparo   |  |
| RX | RX ARTICULACOES SACROILIACAS                         | Não há preparo   |  |
| RX | RX BACIA   | Não há preparo<br><b>EXCETO PARA OS CASOS EM QUE O MÉDICO SOLICITANTE SOLICITAR.</b>   |  |
| RX | RX BRACO   | Não há preparo   |  |
| RX | RX CALCANEO  | Não há preparo   |  |
| RX | RX CLAVICULA   | Não há preparo   |  |
| RX | RX COLUNA CERVICAL                                   | Não há preparo   |  |
| RX | RX COLUNA DORSAL                                     | Não há preparo   |  |
| RX | RX COLUNA DORSO-LOMBAR PARA ESCOLIOSE                | Não há preparo   |  |
| RX | RX COLUNA LOMBO-SACRA                                | Não há preparo<br><b>EXCETO PARA OS CASOS EM QUE O MÉDICO SOLICITANTE SOLICITAR.</b>   |  |

|    |  |                |
|----|--|----------------|
| RX | RX COSTELAS POR HEMITORAX                          | Não há preparo |
| RX | RX COTOVELO  | Não há preparo |
| RX | RX COXA  | Não há preparo |
| RX | RX CRANIO  | Não há preparo |
| RX | RX ESCANOMETRIA                                    | Não há preparo |
| RX | RX ESTERNO   | Não há preparo |
| RX | RX JOELHO  | Não há preparo |
| RX | RX MAO OU QUIRODACTILO                             | Não há preparo |
| RX | RX MAOS E PUNHOS PARA IDADE OSSEA                  | Não há preparo |
| RX | RX MAXILAR INFERIOR                                | Não há preparo |
| RX | RX OMOPLATA OU ESCAPULA                            | Não há preparo |
| RX | RX ORBITAS - BILATERAL                             | Não há preparo |
| RX | RX ORELHA, MASTOIDES OU ROCHEDOS - BILATERAL       | Não há preparo |
| RX | RX OSSOS DA FACE                                   | Não há preparo |
| RX | RX PATELA  | Não há preparo |
| RX | RX PE OU PODODACTILO                               | Não há preparo |
| RX | RX PERNA   | Não há preparo |
| RX | RX PUNHO   | Não há preparo |
| RX | RX SACRO-COCCIX                                    | Não há preparo |
| RX | RX SEIOS DA FACE                                   | Não há preparo |
| RX | RX SELA TURCICA                                    | Não há preparo |
| RX | RX TORAX   | Não há preparo |
| RX | RX TRANSITO COLONICO                               | Não há preparo |
| RX | RX TRANSITO E MORFOLOGIA DO DELGADO                | Não há preparo |
| RX | RX URETROCISTOGRAFIA DE ADULTO                     | Não há preparo |
| RX | RX URETROCISTOGRAFIA DE CRIANCA (ATE 12 ANOS)      | Não há preparo |
| RX | RX UROGRAFIA VENOSA COM BEXIGA PRE E POS-MICCIONAL | Não há preparo |