

Sigla	Procedimento	PREPARO	ORIENTAÇÕES
US	BIOPSIA PERC FRAG MAMARIO AGULHA GROSSA (CORE BIOPSY) POR US	Não há preparo	TODAS AS BIÓPSIAS ASSIM COMO AS PAAFS, É REALIZADO APENAS A COLETADO MATERIAL. A ANÁLISE É DE RESPONSABILIDADE DO LABORATÓRIO, TENDO O PACIENTE DE ENCAMINHAR O MESMO E SE RESPONSABILIZAR PELO PAGAMENTO DESTA ANÁLISE.
US	BX FRAG DE CAVIDADES (FIGADO, RIM, TUMOR, ADRENAIS, LINFONODO)	Não há preparo	TODAS AS BIÓPSIAS ASSIM COMO AS PAAFS, É REALIZADO APENAS A COLETADO MATERIAL. A ANÁLISE É DE RESPONSABILIDADE DO LABORATÓRIO, TENDO O PACIENTE DE ENCAMINHAR O MESMO E SE RESPONSABILIZAR PELO PAGAMENTO DESTA ANÁLISE.
US	US OBSTETRICO 4D	Não há preparo	
US	DOPPLER COLORIDO ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR - UNILATERAL	Não há preparo	
US	DOPPLER COLORIDO ARTERIAL DE MEMBRO SUPERIOR - UNILATERAL	Não há preparo	
US	DOPPLER COLORIDO DE AORTA E ARTERIAS RENAIAS	Jejum de 8 horas; Dieta leve no dia anterior (sopa de legumes, verduras, frutas, chá sem açúcar com bolacha água-e-sal), devendo evitar refrigerante, água com gás, sucos, leite e derivados, pão, macarrão, ovo, doces e alimentos gordurosos; É NECESSÁRIO TOMAR ÁGUA E MANTER BEXIGA CHEIA: Para encher a bexiga você deverá tomar 8 copos de água 2 horas antes do exame; Tomar 1 comprimido de Dimeticona, Flagaz ou Luftal, via oral, de 6/6 horas, iniciando 2 (dois) dias antes do Exame.	
US	DOPPLER COLORIDO DE AORTA E ILIACAS	Não há preparo	
US	DOPPLER COLORIDO DE ARTERIAS PENIANAS (SEM FARMACO INDUCAO)	Não há preparo	
US	DOPPLER COLORIDO DE ARTERIAS VISCERAIS	Não há preparo	
US	DOPPLER COLORIDO DE HEMANGIOMA	Não há preparo	
US	DOPPLER COLORIDO DE ORGAO OU ESTRUTURA ISOLADA	Não há preparo	
US	DOPPLER COLORIDO DE VASOS CERVICAIS ARTERIAIS BILATERAL (CAROTID	Não há preparo	
US	DOPPLER COLORIDO DE VASOS CERVICAIS VENOSOS BILATERAL (SUBCLAVIA	Não há preparo	
US	DOPPLER COLORIDO DE VEIA CAVA SUPERIOR OU INFERIOR	Não há preparo	
US	DOPPLER COLORIDO TRANSFONTANELA	Não há preparo	
US	DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO INFERIOR - UNILATERAL	Não há preparo	
US	DOPPLER COLORIDO VENOSO DE MEMBRO SUPERIOR - UNILATERAL	Não há preparo	

US	DOPPLER HEPATICO / VASOS HEPATICOS	<p>Jejum de 8 horas; Dieta leve no dia anterior (sopa de legumes, verduras, frutas, chá sem açúcar com bolacha água-e-sal), devendo evitar refrigerante, água com gás, sucos, leite e derivados, pão, macarrão, ovo, doces e alimentos gordurosos; É NECESSÁRIO TOMAR ÁGUA E MANTER BEXIGA CHEIA: Para encher a bexiga você deverá tomar 6 copos de água 2 horas antes do exame; Se possível, tomar 1 comprimido de Dimeticona, Flagaz ou Luftal, via oral, de 6/6 horas, iniciando 2 (dois) dias antes do Exame.</p>	
US	DOPPLER TRANSCRANIANO	Não há preparo	
US	DRENAGEM PERCUTANEA ORIENTADA POR US	Não há preparo	
US	HISTEROSSONOGRRAFIA	<ul style="list-style-type: none"> • Não é necessário jejum. • • Abstinência sexual de 02 (dois) dias. • • Tomar 01 (um) comprimido de buscopam Simples ou 01 (um) comprimido de Toragesic sublingual desde que não haja alergia quanto ao uso do mesmo. • A paciente deve estar entre o 5º até o 12º dia do ciclo menstrual, ou seja, após a menstruação. • O exame é contra-indicado se há D32 suspeita de gravidez, para tanto a paciente deve possuir Beta HCG recente (máximo 03 dias) antes da data do exame. • Pacientes em menopausa não precisa de Beta HCG. • O exame é contra indicado se a paciente possuir DIU / febre/ou se existir suspeita de infecção ativa. • Não é possível fazer o mesmo em caso de sangramento presente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Comparecer com 30 minutos de antecedência. • Vir acompanhada de alguém maior de 18 anos. • Trazer pedido médico e exames anteriores. • O exame pode ser realizado mesmo na vigência de sangramento vaginal, mas a paciente deve estar fora do período menstrual.
US	MARCAÇÃO PRE-CIRURGICA POR NODULO - MAXIMO DE 3 NODULOS POR MAMA	Não há preparo	
US	PARACENTESE ORIENTADA POR RX OU US	Não há preparo	
US	PUNÇÃO ARTICULAR DIAGNOSTICA OU TERAPEUTICA (INFILTRAÇÃO)	Não há preparo	
US	PUNÇÃO BIÓPSIA/ASPIRATIVA DE ÓRGÃO OU ESTRUTURA ORIENTADA POR US	Não há preparo	Trazer exames anteriores
US	PUNÇÃO OU BIÓPSIA MAMÁRIA PERCUTANEA POR AGULHA FINA POR US	Não há preparo	
US	PUNÇÃO PLEURAL	Não há preparo	
US	US ABDOME INFERIOR FEMININO (BEXIGA, ÚTERO, OVÁRIO E ANEXOS)	Bexiga cheia	
US	US ABDOME INFERIOR MASCULINO (BEXIGA, PROSTATA E VESÍCULAS)	Bexiga cheia	
US	US ABDOME SUPERIOR (FIGADO, VIAS BILIARES, VESÍCULA, PÂNCREAS)	Não há preparo	

US	US ABDOME TOTAL (ABDOME SUPERIOR, RINS, BEXIGA, AORTA, VEIA CAVA)	<p>Jejum de 8 horas; Dieta leve no dia anterior (sopa de legumes, verduras, frutas, chá sem açúcar com bolacha água-e-sal), devendo evitar refrigerante, água com gás, sucos, leite e derivados, pão, macarrão, ovo, doces e alimentos gordurosos; É NECESSÁRIO TOMAR ÁGUA E MANTER BEXIGA CHEIA: Para a encher a bexiga o paciente deverá tomar 8 copos de água 2 horas antes do exame; Tomar 1 comprimido ou 40 gotas de Dimeticona, Flagaz ou Luftal, via oral, de 6/6 horas, iniciando 24 horas antes do Exame; Não há necessidade da suspensão de medicações, contanto que sejam tomadas com água. Mesmo que você já tenha feito cirurgia da vesícula o jejum continua sendo obrigatório;</p> <p>US ABDOMEN TOTAL CRIANÇA Menores de 1 ano: Jejum de 3 horas. De 1 a 4 anos: Jejum de 4 horas 5 anos: Jejum de 8 horas Observações: Levar mamadeira ou lanche para após o exame; Não é necessário ingerir água; Não é necessário uso de medicação;</p>	<p>Procure usar roupas confortáveis, preferencialmente de duas peças; Trazer exames anteriores de acordo com a região a ser examinada: Caso tenha exames anteriores relacionados com a região a ser examinada pedimos a gentileza de trazê-los. A comparação com exames anteriores proporciona diagnósticos mais precoces e evita, muitas vezes, a realização de incidências adicionais.</p>
US	US APARELHO URINARIO (RINS, URETERES E BEXIGA)	Bexiga cheia	
US	US ARTICULAR (POR ARTICULACAO)	Não há preparo	
US	US CRANIO PARA CRIANCA	Não há preparo	
US	US DINAMICO DO APARELHO URINARIO	<p>Não é necessário jejum; Os líquidos podem ser qualquer um (água, leite, suco, etc); Seguir a quantidade de líquido recomendada no preparo; Informar peso e altura na hora do exame; • Recém-nascido e menores de 2 anos: 30 minutos antes do exame a criança deverá ingerir leite materno ou artificial, na quantidade de rotina. • Pacientes de 2 a 7 anos: Ingerir 150 ml de qualquer tipo de líquido que a criança aceitar (leite, suco, etc) 60 min antes do exame e mais 150 ml 30 min antes do exame. • Pacientes de 7 anos em diante (adolescentes e adultos): Ingerir 150 ml de qualquer tipo de líquido que o paciente aceitar (leite, suco, etc) 90 min antes do exame, mais 150 ml 60 min antes do exame e mais 150 ml 30 min antes do exame.</p>	<p>Este exame pode ser demorado em função da necessidade de encher e esvaziar a bexiga. Portanto o paciente precisa vir com disponibilidade de tempo.</p>
US	US DOPPLER HEPATICO	Não há preparo	
US	US ESTRUTURAS SUPERFICIAIS (CERVICAL/AXILAS/MUSCULO/TENDAO)	Não há preparo	
US	US GLANDULAS SALIVARES (TODAS)	Não há preparo	

US	US MAMAS + US AXILAS	Não há preparo	
US	US OBSTETRICA	Não há preparo	
US	US OBSTETRICA 1 TRIMESTRE (ENDOVAGINAL)	Não há preparo	
US	US OBSTETRICA COM DOPPLER COLORIDO	Não há preparo	
US	US OBSTETRICA GESTACAO MULTIPLA COM DOPPLER COLORIDO CADA FETO	Não há preparo	
US	US OBSTETRICA GESTACAO MULTIPLA: CADA FETO	Não há preparo	
US	US OBSTETRICA: PERFIL BIOFISICO FETAL	Não há preparo	
US	US OBSTETRICO MORFOLOGICO COM DOPPLER DAS ARTERIAS UTERINAS	Não há preparo	Exame realizado entre 13 a 14 semanas
US	US OBSTETRICO MORFOLOGICO COM MEDIDA DO COLO UTERINO	Não há preparo	Exame realizado entre 22 a 24 semanas
US	US ORGAOS SUPERFICIAIS (TIREOIDE OU ESCROTO OU PENIS OU CRANIO)	Não há preparo	
US	US PELVICA (GINECOLOGICA)	Bexiga Cheia	
US	US PROSTATA (VIA ABDOMINAL)	Bexiga cheia	
US	US PROSTATA TRANSRETAL (NAO INCLUI ABDOME INFERIOR MASCULINO)	Não há preparo	
US	US PROSTATA TRANSRETAL COM BIOPSIA - MAIS DE 8 FRAGMENTOS	Consultar o atendimento da LifeScan	
US	US TORACICO EXTRACARDIACO	Não há preparo	
US	US TRANSVAGINAL (UTERO, OVARIO, ANEXOS E VAGINAL)	Bexiga Cheia	
US	US TRANSVAGINAL PARA CONTROLE DE OVULACAO (3 OU MAIS EXAMES)	Bexiga Cheia	O primeiro exame é realizado preferencialmente entre o 10º e o 12º dia do ciclo menstrual, ou a critério do médico solicitante. Os demais exames serão realizados dois e quatro dias após o primeiro exame.
US	US TRANSVAGINAL PARA PESQUISA DE ENDOMETRIOSE	<p>Jejum de 8 horas; Laxante 24 horas antes da realização do exame Dieta leve no dia anterior (sopa de legumes, verduras, frutas, chá sem açúcar com bolacha água-e-sal), devendo evitar refrigerante, água com gás, sucos, leite e derivados, pão, macarrão, ovo, doces e alimentos gordurosos; É NECESSÁRIO TOMAR ÁGUA E MANTER BEXIGA CHEIA: Para a encher a bexiga o paciente deverá tomar 8 copos de água 2 horas antes do exame; Se possível, tomar 1 comprimido ou 40 gotas de Dimeticona, Flagaz ou Luftal, via oral, de 6/6 horas, iniciando 1 (dia) dias antes do Exame; Não há necessidade da suspensão de medicações, contanto que sejam tomadas com água. Mesmo que você já tenha feito cirurgia da vesícula o jejum continua sendo obrigatório;</p>	<p>Procure usar roupas confortáveis, preferencialmente de duas peças; Trazer exames anteriores de acordo com a região a ser examinada: Caso tenha exames anteriores relacionados com a região a ser examinada pedimos a gentileza de trazê-los. A comparação com exames anteriores proporciona diagnósticos mais precoces e evita, muitas vezes, a realização de incidências adicionais.</p>